

АМІАК

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Аміак широко застосовують у промисловості, та в разі його витоку – становить загрозу життю і здоров'ю людини



ЯК РОЗПІЗНАТИ?

- Безбарвний газ з різким задушливим запахом нашатирного спирту, що майже у два рази легший за повітря та добре розчиняється у воді
- Перевозять у зрідженому стані під тиском; при потраплянні в атмосферу аміак «димить»
- Випари аміаку високо підіймаються у повітрі, розсіюються та не накопичуються в низинах.
- Однак при підвищеній вологості можуть розноситися над поверхнею землі
- Міститься в багатьох побутових і промислових мийних засобах, в холодильних машинах
- Близько 80% аміаку використовується в сільському господарстві у якості добрива



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- За допомогою засобів масової інформації (радіо, телебачення, інтернет) слідкуйте за інформацією та інструкціями від місцевих органів влади та ДСНС
- Надіньте пов'язку, змочену слабким 5% розчином лимонної або оцтової кислоти
- Не користуйтеся відкритим вогнем. При змішуванні аміаку з повітрям може утворитися вибухонебезпечна суміш
- Проведіть герметизацію квартири: зачиніть вікна, кватирки, двері
- Вимкніть усі електропобутові прилади, вентилятори, системи обігріву та охолодження, перекрийте газ
- Виходьте із зони забруднення низинами та у напрямку, перпендикулярному руху вітру
- Якщо під час виникнення небезпеки ви перебуваєте у автомобілі, щільно зачиніть усі вікна та вимкніть систему кондиціонування. Після виходу з автомобіля не торкайтеся його зовнішніх поверхонь

УРАЖЕННЯ АМІАКОМ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЕТАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ



СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ВИНИКАЮТЬ ПРАКТИЧНО ВІДРАЗУ

- Сльозотеча, нежить, підвищене слиновиділення
- Першіння та біль у горлі, напади сухого кашлю, осиплість голосу
- Головний біль, почуття тиску у грудній клітці, ознаки задухи
- Диспепсичні розлади (біль у животі, нудота, блювання, печія)
- Розлад дихання і кровообігу, набряк легенів або пневмонія
- При потраплянні на шкіру можливий хімічний опік
- При ураженні очей у більшості випадків прогноз несприятливий, можлива втрата зору
- Віддалені наслідки отруєння: тремор кінцівок, амнезія, дезорієнтація, зменшення чутливості, запаморочення, послаблення зору та слуху



ПЕРША ДОПОМОГА

- Викличте бригаду швидкої допомоги або зверніться за кваліфікованою допомогою до найближчого медичного закладу
- Вийдіть на свіже повітря, зберігайте тепло і спокій
- Зробіть інгаляцію зволеним киснем або теплою водяною парою з розчином ментолу у хлороформі за допомогою прибору для інгаляцій
- Випийте тепле молоко з харчовою содою та знеболюючі засоби
- Шкіру промийте проточною водою та накладіть примочки 5% розчину лимонної, оцтової або борної кислоти
- Очі ретельно промийте проточною водою, після чого закачайте розчином дикаїну або змастіть вазеліном чи оливковою олією та накладіть на повіки ватно-марлеву пов'язку
- Рот, ніс, горло промийте 5% розчином лимонної кислоти впродовж 15 хвилин



ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 101

ПРИ ВИЯВЛЕННІ БУДЬ-ЯКОЇ ПІДОЗРИ НА ВИТІК АМІАКУ



ОБСЄ